

新中國自修學院

文化系 新聞學 (36) 魯風編

新聞記者之種類

新聞記者之種類，由於性質上的分工，有「政治記者」、「軍事記者」、「社會記者」、「經濟記者」、「教育記者」、「體育記者」、「文化記者」等數種。這是屬於「縱」一方面的分類；「橫」一方面的分類，有「通訊員」、「特派員」、「特約員」等數種。統稱之謂「外勤記者」。

普通一般人，對於從事新聞工作的人，統稱之為「新聞記者」。這是廣義的說法。如嚴格地說，新聞記者，應指在新聞機關中，從事新聞工作的人而言。如「通訊員」、「特派員」、「特約員」等，雖然是從事新聞工作，但他們是受新聞機關之委託，在新聞機關之外，從事新聞工作的人，應稱之為「外勤記者」，而不應稱之為「新聞記者」。

「新聞記者」一詞，又可分為「內勤記者」與「外勤記者」兩種。內勤記者，指在新聞機關中，從事新聞工作的人而言。外勤記者，指在新聞機關之外，從事新聞工作的人而言。

在新聞記者中，又可分為「政治記者」、「軍事記者」、「社會記者」、「經濟記者」、「教育記者」、「體育記者」、「文化記者」等數種。這是屬於「縱」一方面的分類；「橫」一方面的分類，有「通訊員」、「特派員」、「特約員」等數種。統稱之謂「外勤記者」。

醫藥顧問

醫藥顧問

（一）關於感冒：感冒之起，多由於受寒，或因風寒而起。其症狀為鼻塞、流涕、咳嗽、發熱等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用感冒藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（二）關於咳嗽：咳嗽之起，多由於感冒而起。其症狀為喉乾、咳嗽、痰多等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用止咳藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（三）關於發熱：發熱之起，多由於感冒而起。其症狀為發熱、頭痛、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用退熱藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（四）關於頭痛：頭痛之起，多由於感冒而起。其症狀為頭痛、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用止痛藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（五）關於全身不適：全身不適之起，多由於感冒而起。其症狀為全身不適、發熱、頭痛等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用退熱藥。如症狀嚴重，應請醫治。

醫藥顧問

醫藥顧問

（六）關於失眠：失眠之起，多由於精神過度緊張而起。其症狀為失眠、頭痛、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用安眠藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（七）關於胃病：胃病之起，多由於飲食不節而起。其症狀為胃痛、消化不良、嘔吐等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用胃藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（八）關於肝病：肝病之起，多由於酒色過度而起。其症狀為肝痛、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用肝病藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（九）關於腎病：腎病之起，多由於勞力過度而起。其症狀為腰痛、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用腎病藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（十）關於心臟病：心臟病之起，多由於勞力過度而起。其症狀為心悸、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用心臟藥。如症狀嚴重，應請醫治。

醫藥顧問

醫藥顧問

（十一）關於糖尿病：糖尿病之起，多由於遺傳而起。其症狀為口渴、多飲、多尿、體重減輕等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用降糖藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（十二）關於高血壓：高血壓之起，多由於勞力過度而起。其症狀為頭痛、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用降壓藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（十三）關於哮喘：哮喘之起，多由於感冒而起。其症狀為咳嗽、氣喘、痰多等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用哮喘藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（十四）關於肺病：肺病之起，多由於感冒而起。其症狀為咳嗽、氣喘、痰多等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用肺病藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（十五）關於癌症：癌症之起，多由於遺傳而起。其症狀為全身不適、發熱、頭痛等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用癌症藥。如症狀嚴重，應請醫治。

醫藥顧問

醫藥顧問

（十六）關於梅毒：梅毒之起，多由於不潔之性行為而起。其症狀為皮膚潰瘍、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用梅毒藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（十七）關於淋病：淋病之起，多由於不潔之性行為而起。其症狀為尿道發炎、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用淋病藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（十八）關於白帶：白帶之起，多由於陰道發炎而起。其症狀為陰道發癢、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用白帶藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（十九）關於月經不調：月經不調之起，多由於勞力過度而起。其症狀為月經不準、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用月經藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（二十）關於不孕症：不孕症之起，多由於勞力過度而起。其症狀為不孕、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用不孕症藥。如症狀嚴重，應請醫治。

醫藥顧問

醫藥顧問

（二十一）關於小兒驚風：小兒驚風之起，多由於感冒而起。其症狀為抽搐、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒驚風藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（二十二）關於小兒疳積：小兒疳積之起，多由於飲食不節而起。其症狀為腹脹、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒疳積藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（二十三）關於小兒咳嗽：小兒咳嗽之起，多由於感冒而起。其症狀為咳嗽、氣喘、痰多等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒咳嗽藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（二十四）關於小兒發熱：小兒發熱之起，多由於感冒而起。其症狀為發熱、頭痛、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒發熱藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（二十五）關於小兒頭痛：小兒頭痛之起，多由於感冒而起。其症狀為頭痛、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒頭痛藥。如症狀嚴重，應請醫治。

醫藥顧問

醫藥顧問

（二十六）關於小兒驚風：小兒驚風之起，多由於感冒而起。其症狀為抽搐、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒驚風藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（二十七）關於小兒疳積：小兒疳積之起，多由於飲食不節而起。其症狀為腹脹、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒疳積藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（二十八）關於小兒咳嗽：小兒咳嗽之起，多由於感冒而起。其症狀為咳嗽、氣喘、痰多等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒咳嗽藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（二十九）關於小兒發熱：小兒發熱之起，多由於感冒而起。其症狀為發熱、頭痛、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒發熱藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（三十）關於小兒頭痛：小兒頭痛之起，多由於感冒而起。其症狀為頭痛、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒頭痛藥。如症狀嚴重，應請醫治。

醫藥顧問

醫藥顧問

（三十一）關於小兒驚風：小兒驚風之起，多由於感冒而起。其症狀為抽搐、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒驚風藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（三十二）關於小兒疳積：小兒疳積之起，多由於飲食不節而起。其症狀為腹脹、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒疳積藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（三十三）關於小兒咳嗽：小兒咳嗽之起，多由於感冒而起。其症狀為咳嗽、氣喘、痰多等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒咳嗽藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（三十四）關於小兒發熱：小兒發熱之起，多由於感冒而起。其症狀為發熱、頭痛、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒發熱藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（三十五）關於小兒頭痛：小兒頭痛之起，多由於感冒而起。其症狀為頭痛、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒頭痛藥。如症狀嚴重，應請醫治。

醫藥顧問

醫藥顧問

（三十六）關於小兒驚風：小兒驚風之起，多由於感冒而起。其症狀為抽搐、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒驚風藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（三十七）關於小兒疳積：小兒疳積之起，多由於飲食不節而起。其症狀為腹脹、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒疳積藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（三十八）關於小兒咳嗽：小兒咳嗽之起，多由於感冒而起。其症狀為咳嗽、氣喘、痰多等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒咳嗽藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（三十九）關於小兒發熱：小兒發熱之起，多由於感冒而起。其症狀為發熱、頭痛、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒發熱藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（四十）關於小兒頭痛：小兒頭痛之起，多由於感冒而起。其症狀為頭痛、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒頭痛藥。如症狀嚴重，應請醫治。

醫藥顧問

醫藥顧問

（四十一）關於小兒驚風：小兒驚風之起，多由於感冒而起。其症狀為抽搐、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒驚風藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（四十二）關於小兒疳積：小兒疳積之起，多由於飲食不節而起。其症狀為腹脹、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒疳積藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（四十三）關於小兒咳嗽：小兒咳嗽之起，多由於感冒而起。其症狀為咳嗽、氣喘、痰多等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒咳嗽藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（四十四）關於小兒發熱：小兒發熱之起，多由於感冒而起。其症狀為發熱、頭痛、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒發熱藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（四十五）關於小兒頭痛：小兒頭痛之起，多由於感冒而起。其症狀為頭痛、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒頭痛藥。如症狀嚴重，應請醫治。

醫藥顧問

醫藥顧問

（四十六）關於小兒驚風：小兒驚風之起，多由於感冒而起。其症狀為抽搐、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒驚風藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（四十七）關於小兒疳積：小兒疳積之起，多由於飲食不節而起。其症狀為腹脹、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒疳積藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（四十八）關於小兒咳嗽：小兒咳嗽之起，多由於感冒而起。其症狀為咳嗽、氣喘、痰多等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒咳嗽藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（四十九）關於小兒發熱：小兒發熱之起，多由於感冒而起。其症狀為發熱、頭痛、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒發熱藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（五十）關於小兒頭痛：小兒頭痛之起，多由於感冒而起。其症狀為頭痛、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒頭痛藥。如症狀嚴重，應請醫治。

醫藥顧問

醫藥顧問

（五十一）關於小兒驚風：小兒驚風之起，多由於感冒而起。其症狀為抽搐、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒驚風藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（五十二）關於小兒疳積：小兒疳積之起，多由於飲食不節而起。其症狀為腹脹、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒疳積藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（五十三）關於小兒咳嗽：小兒咳嗽之起，多由於感冒而起。其症狀為咳嗽、氣喘、痰多等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒咳嗽藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（五十四）關於小兒發熱：小兒發熱之起，多由於感冒而起。其症狀為發熱、頭痛、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒發熱藥。如症狀嚴重，應請醫治。

（五十五）關於小兒頭痛：小兒頭痛之起，多由於感冒而起。其症狀為頭痛、發熱、全身不適等。其治療法，宜多休息，多飲水，並服用小兒頭痛藥。如症狀嚴重，應請醫治。

經濟分類

華興隆：專營各類百貨，貨真價實，童叟無欺。地址：南京路123號。電話：123456。

華興隆：專營各類百貨，貨真價實，童叟無欺。地址：南京路123號。電話：123456。

生活分類

華興隆：專營各類百貨，貨真價實，童叟無欺。地址：南京路123號。電話：123456。

華興隆：專營各類百貨，貨真價實，童叟無欺。地址：南京路123號。電話：123456。

醫藥分類

華興隆：專營各類百貨，貨真價實，童叟無欺。地址：南京路123號。電話：123456。

華興隆：專營各類百貨，貨真價實，童叟無欺。地址：南京路123號。電話：123456。

教育分類

華興隆：專營各類百貨，貨真價實，童叟無欺。地址：南京路123號。電話：123456。

華興隆：專營各類百貨，貨真價實，童叟無欺。地址：南京路123號。電話：123456。

娛樂分類

華興隆：專營各類百貨，貨真價實，童叟無欺。地址：南京路123號。電話：123456。

華興隆：專營各類百貨，貨真價實，童叟無欺。地址：南京路123號。電話：123456。

交通分類

華興隆：專營各類百貨，貨真價實，童叟無欺。地址：南京路123號。電話：123456。

華興隆：專營各類百貨，貨真價實，童叟無欺。地址：南京路123號。電話：123456。

其他分類

華興隆：專營各類百貨，貨真價實，童叟無欺。地址：南京路123號。電話：123456。

華興隆：專營各類百貨，貨真價實，童叟無欺。地址：南京路123號。電話：123456。